

## DOSSIER FOTOGRÁFICO

### Hábitat:



Fotografía 1. Hábitat óptimo para *A. chamaemelifolia* subsp. *cantabrica*: pastos vivaces mesófilos, basófilos, más o menos pedregosos procedentes de la fijación de gleras, pertenecientes a la asociación *Helianthemo cantabrici-Brometum erecti* (51.a.01.101).



Fotografía 2. Diferentes hábitats en los que vive *A. chamaemelifolia* subsp. *cantabrica*: aulagares del *Lithodoro diffusae-Genistetum occidentalis* (52.a.05.006) (en primer término); pastos vivaces basófilos, pertenecientes a la asociación *Helianthemo cantabrici-Brometum erecti* (51.a.01.101) (en el centro); roquedos calizos del *Saxifragion trifurcato-canaliculatae* (27.a.03.101) (parte superior derecha) y pedregales calizos con grandes bloques estabilizados, del *Cystopterido pseudoregiae-Dryopteridetum submontanae* (33.c.10.101) (puntual en la parte superior derecha).

**Plano general:**

Fotografía 3. *A. chamaemelifolia* subsp. *cantabrica* en un pasto del *Helianthemo cantabrici-Brometum erecti*, (51.a.01.101), que se desarrolla en un claro de un sabinar rastrero del *Arctostaphylo crassifoliae-Juniperetum sabiniae* (74.a.02.005).



Fotografía 4. Primer plano de *A. chamaemelifolia* subsp. *cantabrica* en la foto anterior.



Fotografía 5. *A. chamaemelifolia* subsp. *cantabrica* en roquedo calizo del *Saxifragion trifurcatocaniculatae* (27.a.03.101) y pasto vivaz del *Helianthemo cantabrici-Brometum erecti*, (51.a.01.101), que se desarrolla al pie del roquedo.



Fotografía 6. *A. chamaemelifolia* subsp. *cantabrica* en enebral rastrero basófilo, del *Daphno cantabricae-Arctostaphyletum uva-ursi* (77.b.03.003).

**Detalles:**

Fotografía 7. Detalle de la parte superior de la planta, con hojas 2-3 pinnatisectas e inflorescencia en panícula de capítulos, en este caso subracemosa (poco ramificada).



Fotografía 8. Detalle de la inflorescencia con las brácteas similares a las hojas pero más pequeñas, excepto las del ápice que son simples, y los capítulos con numerosas y pequeñas flores amarillas.



Fotografía 9. Detalle de la inflorescencia en panícula de capítulos, mucho más ramificada que en la foto 7, con los capítulos en flor.



Fotografía 10. Detalle de la inflorescencia en panícula de capítulos, mucho más ramificada que en la foto 7, con los capítulos fructificados.



Fotografía 11. Detalle de la inflorescencia, poco ramificada, con las brácteas similares a las hojas pero más pequeñas, excepto las del ápice que son simples, con los capítulos fructificados.



Fotografía 12. Detalle de la inflorescencia, poco ramificada, con las brácteas similares a las hojas pero más pequeñas, excepto las del ápice que son simples, con los capítulos fructificados (poco maduros) y brácteas del involucre exteriores verdosas y las interiores verdosas con margen escarioso parduzco.

**Situaciones de deterioro:**