

Daphne cneorum L.

DOSSIER FOTOGRÁFICO

Autores: C.Molina & G. Montamarta

Hábitat



Fotos 1 y 2. Brezales de *Calluna vulgaris*, *Erica vagans*, *Erica cinerea* y *Erica scoparia* en la vertiente N de la Sierra de Cabrejas (Soria), hábitat óptimo para *Daphne cneorum*.



Foto 2. Brezales abiertos de *Erica cinerea* con *Lithodora difusa*, en la Cubada Grande de Castro Valnera (Burgos), donde se encuentra la única población de *Daphne cneorum* en esta zona burgalesa.

Plano general



Foto 4. *Daphne cneorum* en un pequeño claro entre brezales.

Detalles



Foto 5. Botones florales de color rosa más intenso que las flores abiertas.



Foto 6. Formación de céspedes densos que emergen entre los herbazales mesófilos.

Situaciones de deterioro



Foto 7. Apilado de pacas de paja en los brezales donde se encuentra *Daphne cneorum*.



Foto 8. Roderas de maquinaria Agrícola por mitad de los brezales donde se encuentra *Daphne cneorum*. Se observa en foto mata de *Daphne cneorum*.



Foto 9. Roturaciones para transformación en cultivos en brezales donde se encuentra *Daphne cneorum*.



Foto 10. Rozas de brezales para la creación de pastos



Foto 11. Caminos agrícolas y espontáneos sobre los brezales donde se encuentra *Daphne cneorum*.