


## DOSSIER FOTOGRÁFICO

### Hábitat



Fotografía 2. Uno de los hábitats principales para la especie: prado higrófilo, neutro-basófilo del *Molinion caeruleae* (59.a.01.101). La Valcueva (León).



Fotografía 2. Otro de los hábitats principales para la especie: comunidad turbícola neutro-basófila del *Caricion davallianae* (14.c.04.101).

### Plano general



Fotografía 3. Plano general de la planta en el hábitat de la fotografía 1.



Fotografía 4. Plano general de dos ejemplares de *S. aestivalis* y 1 de *S. spiralis* (en el medio). Material de herbario: *S. aestivalis* (LEB 5372); *S. spiralis* (LEB 83116).

## Detalles



Fotografía 5. Detalle de la parte inferior de *S. spiralis* (drcha), con las hojas ovado elípticas, en una roseta situada al lado del tallo fértil y tubérculos elipsoideos y *S. aestivalis* (izda) con las hojas linear-lanceoladas, que abrazan la parte inferior del tallo fértil y tubérculos napiformes. Material de herbario: *S. aestivalis* (LEB 5372); *S. spiralis* (LEB 83116).



Fotografía 6. Detalle de la parte superior del tallo y de la inflorescencia.



Fotografía 7. Detalle de la la inflorescencia con el eje retorcido (flores dispuestas helicoidalmente). En la parte superior en flor y en la inferior comenzando la fructificación.



Fotografía 8. Detalle de la parte superior de la inflorescencia de la fotografía anterior.

**Situaciones de deterioro:**



Fotografía 9. Pista realizada para la instalación de un gaseoducto que atraviesa varias praderas de *Molinion caeruleae* y turberas de *Caricion davallianae*, en las que se desarrolla *S. aestivalis*. La Valcueva (León).



Fotografía 10. Vista de la pista anterior desde la pradera de *Molinion caeruleae*. Se observa el deterioro de la misma.



Fotografía 11. Pastoreo, pisoteo y nitrificación por presencia de ganado en pradera de *Molinion caeruleae*. La Valcueva-Avisdos (León).