



# Riberas del Río Orbigo y afluentes

ES4130065

30/04/2013

## Flora de Interés Especial

En este espacio natural se han citado o inventariado un total de 1 taxones de interés especial, de los cuales 1 lo son desde un punto de vista regional por estar incluidos en alguna normativa legal que los protege, mientras que 0 presentan este interés especial únicamente desde un enfoque local.

A continuación se presenta el listado de los taxones de Flora de Interés Especial, ordenados alfabéticamente, en el que se indica el criterio de interés local por el que se ha incluido cada taxón o la normativa legal en la que aparece incluido. Tras dicho listado aparecen una serie de fichas descriptivas, con una descripción general acompañada de otra relativa a su hábitat y biología, y finalmente, bajo el epígrafe “Comentarios locales”, todas las observaciones relativas a su presencia en este espacio natural, distribución general, grado de abundancia, rareza, escasez estado de conservación, hábitat habitual, etc. que han estimado oportuno señalar los autores de la cartografía.

<b>Flora de Interés Especial</b>	<b>Riberas del Río Orbigo y afluentes</b>	<b>30/04/2013</b>
----------------------------------	---	-------------------

Especie	Int. Local	Decreto flora	Anexos DH	LESRPE	CEEA
Santolina semidentata Hoffmans & Link		3 Atenc. Pref.	II IV	*	

### Criterios de Interés Local

5B - Taxones localmente escasos y cuyas poblaciones podrían resultar afectadas por diversas perturbaciones.

5C - Taxones localmente no muy abundantes, sometidos a aprovechamientos o recolecciones masivas que podrían disminuir notoriamente sus poblaciones.

5X - Taxones localmente ligados a hábitats en regresión o amenazados.

5Y - Taxones que localmente encuentran alguno de sus límites biogeográficos.

***Santolina semidentata Hoffmans & Link (Compositae)*****DESCRIPCIÓN:**

Planta de erecta a decumbente. Tallos y capítulos de glabrescentes a canescentes. Hojas de los entrenudos y tallos fértiles de crenado-dentadas a pinnatipartidas, pecioladas, mucronuladas, de glabrescentes a cano-tomentosas. Brácteas externas del involucre lanceoladas, con ápice estrechamente escarioso, no decurrente; brácteas internas con ápice escarioso más amplio, denticulado-lacerado, apenas decurrente en el margen. Brácteas interseminales pelosas en la parte superior. Flores glandulosas.

**Hábitat:** Hábitat principal: Tomillares y pastizales subnitrófilos sobre suelos someros.  
Substrato: Indiferente al substrato.  
Rango altitudinal: 300-1100 m.

**Biología:** Tipo Biológico:  
Fenología: Mayo-Septiembre.

**INTERÉS LOCAL:**

Hemos inventariado este taxon formando parte de aulagares-tomillares asociados al río.

**CRITERIOS DE INTERÉS:**

**Decreto flora CyL**  
**3 Atenc. Pref.**  
Valor Local

**Anexos Directiva Hábitat**  
**II-IV**

**LESRPE - RD 139/201**  
**\***

**CEEA - RD 139/2011**